

Sayı :80981279

Konu : Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları

## KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı, Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi tarafından yapılan “Human Albumin Etken Maddeli İlaçların Tüketimleri” konulu çalışma sonucunda bu ilaçların etkin, doğru ve ekonomik olarak kullanımını sağlamak amacıyla; Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Tesislerinde Human Albumin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 4.2.27.Ç Human Albumin kullanım ilkelerine uygun şekilde işlem tahsis edilmelidir. Bunlar;
  - a. Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir.
  - b. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir.
  - c. Plazmaferezde veya karaciğer nakli yapılmış hastalarda kan albümin düzeyi şartı aranmaz.
2. Human Albumin kullanımında Hipoalbuminemi teşhisi yerine **Human Albumin’in ruhsatlı endikasyonları ile kullanılması** gerekmektedir. Bunlar;
  - a. Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup masif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi  $2 \geq$ g/dl olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında,
  - b. Asit varlığında ‘Spontan bakteriyel peritonit’ gelişen hastalarda tedavi yardımcı olarak,  
**Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak,**
  - c. Kök hücre transplantasyonu ve veno okluzif hastalık tedavisinde,
  - d. Septik şok tablosunda kristaloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi  $2 \geq$ g/dl olan yoğun bakım hastalarında,

Sayı :80981279

Konu : Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları

- e. Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik sendrom tanılı ve kan albumin düzeyi  $2 \geq g/dl$  olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediyatrik hastalarda,
  - f. Gebelik toksemisinde; kan albumin düzeyi  $2 \geq g/dl$  olan olgularda (preklampsi ve eklampsi tablolarında )
  - g. İatrojenik ovarian hiperstimülasyon sendromunda (OHSS) ; kan albumin düzeyi  $2 \geq g/dl$  altında olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan hastalarda endikedir.
3. Yatan hastalara Human Albumin günlük tetkik sonuçları dikkate alınarak, **tek günlük dozlar halinde mor reçete ile** verilmelidir.
4. **Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinde bununla ilgili uyarı ve ikazların** bulundurulması gerekmektedir. (Ek: HBYS Albumin İkaz Algoritma)

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Fuat KANTARCI  
Kurum Başkanı a.  
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:

88 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri

Ek:

HBYS Albumin İkaz Algoritma (1 sayfa)



TC Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Kamu  
Hastaneleri Kurumu

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı :80981279

Konu : Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları  
Ek: HBYS Albumin İkaz Algoritma

